

| 1. Обеспечение запасами в соответствии с планом | | Обеспечение запасами в соответствии с планом в среднем по организациям | | | | | | |
|--|---|---|-------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| № | Продукт | Дозировка продукта | Здравпункты | Медицинские центры | Районные больницы | Региональная больница | Региональные медицинские магазины | Центральные медицинские магазины |
| | Число наблюдений: | | 90 | 90 | 45 | 8 | 8 | 1 |
| 1 | Эфавиренз/Ламивудин/Тенофовир | 600/300/300 мг | -- | 60 % | 75 % | 75 % | 83 % | 83 % |
| 2 | Ламивудин/Зидовудин | 30/60 мг | -- | 55 % | 85 % | 70 % | 83 % | 83 % |
| 3 | Набор для экспресс-диагностики ВИЧ | Нет | 65 % | 80 % | 76 % | 64 % | 100 % | 100 % |
| 4 | Артемизинин/Лумефантрин (АЛ) 6x4 | 20/120 мг | 40 % | 50 % | 60 % | 61 % | 83 % | 83 % |
| 5 | Быстрый диагностический тест на малярию | Нет | 35 % | 44 % | 53 % | 58 % | 63 % | 63 % |
| 6 | Медоксипрогестерона ацетат для инъекций | 104 мг/мл | 75 % | 75 % | 81 % | 90 % | 100 % | 100 % |
| 7 | Левоноргестрел 1–стержневой имплантат | 1–стержневой | 80 % | 80 % | 83 % | 90 % | 100 % | 100 % |
| 8 | Окситоцин для инъекций | 10 МЕ/мл | 15 % | 19 % | 35 % | 46 % | 50 % | 50 % |
| 9 | Сульфат магния для инъекций (50 %) | 5 г/10 мл | 22 % | 23 % | 35 % | 44 % | 50 % | 50 % |
| 10 | Амоксициллин | 250 мг | 18 % | 26 % | 33 % | 51 % | 63 % | 63 % |
| 11 | Парацетамол | 500 мг | 17 % | 28 % | 39 % | 46 % | 63 % | 63 % |
| Диапазон продуктов-маркеров | | | 15–80 % | 19–80 % | 33–85 % | 44–90 % | 50–100 % | 50–100 % |

| 2а. Процент организаций, в которых в день оценки наблюдался дефицит | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| № | Продукт | Дозировка продукта | Здравпункты | Медицинские центры | Районные больницы | Региональная больница | Региональные медицинские магазины | Центральные медицинские магазины |
| | Число наблюдений: | | 90 | 90 | 45 | 8 | 8 | 1 |
| 1 | Эфавиренз/Ламивудин/Тенофовир | 600/300/300 мг | -- | 8 % | 4 % | 12 % | 12 % | 0 % |
| 2 | Ламивудин/Зидовудин | 30/60 мг | -- | 7 % | 3 % | 12 % | 12 % | 0 % |
| 3 | Набор для экспресс-диагностики ВИЧ | Нет | 11 % | 6 % | 8 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 4 | Артемизинин/Лумефантрин (АЛ) 6x4 | 20/120 мг | 17 % | 9 % | 8 % | 0 % | 0 % | 100 % |
| 5 | Быстрый диагностический тест на малярию | Нет | 22 % | 7 % | 6 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 6 | Медоксипрогестерона ацетат для инъекций | 104 мг/мл | 4 % | 2 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 7 | Левоноргестрел 1–стержневой имплантат | 1–стержневой | 3 % | 2 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 8 | Окситоцин для инъекций | 10 МЕ/мл | 40 % | 24 % | 10 % | 24 % | 12 % | 0 % |
| 9 | Сульфат магния для инъекций (50 %) | 5 г/10 мл | 37 % | 29 % | 11 % | 12 % | 12 % | 100 % |
| 10 | Амоксициллин | 250 мг | 44 % | 22 % | 15 % | 24 % | 37 % | 0 % |
| 11 | Парацетамол | 500 мг | 35 % | 20 % | 17 % | 12 % | 24 % | 0 % |
| Диапазон продуктов-маркеров | | | 3–44 % | 2–29 % | 4–17 % | 0–24 % | 0–24 % | 0–100 % |

| 2b. Дни дефицита за период с февраля 2019 г. по июль 2019 г. | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| № | Продукт | Дозировка продукта | Здравпункты | Медицинские центры | Районные больницы | Региональная больница | Региональные медицинские магазины | Центральные медицинские магазины |
| | Число наблюдений: | | 90 | 90 | 45 | 8 | 8 | 1 |
| 1 | Эфавиренз/Ламивудин/Тенофовир | 600/300/300 мг | -- | 1,1 | 1,7 | 0 | 0,4 | 0 |
| 2 | Ламивудин/Зидовудин | 30/60 мг | -- | 1,9 | 1,6 | 0,6 | 0,4 | 0 |
| 3 | Набор для экспресс-диагностики ВИЧ | Нет | 5,3 | 3,4 | 3,0 | 0,5 | 1 | 0 |
| 4 | Артемизинин/Люмефантрин (АЛ) 6x4 | 20/120 мг | 6,4 | 4,3 | 3,3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Быстрый диагностический тест на малярию | Нет | 7,1 | 4,1 | 3,0 | 1,2 | 0 | 0 |
| 6 | Медроксипрогестерона ацетат для инъекций | 104 мг/мл | 3,5 | 1,7 | 1,6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Левоноргестрел 1–стержневой имплантат | 1–стержневой | 2,1 | 1,1 | 1,3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Окситоцин для инъекций | 10 МЕ/мл | 10 | 8,1 | 4,3 | 2,4 | 1,5 | 0 |
| 9 | Сульфат магния для инъекций (50 %) | 5 г/10 мл | 11,7 | 7,6 | 4,4 | 3,7 | 2,3 | 0 |
| 10 | Амоксициллин | 250 мг | 12 | 7,9 | 6,3 | 3,3 | 1,4 | 0 |
| 11 | Парацетамол | 500 мг | 18 | 6,9 | 8,0 | 2,9 | 1,6 | 0 |
| Диапазон продуктов-маркеров | | | 2,1–11,7 | 1,1–8,1 | 1,6–8,0 | 0–3,7 | 0–2,3 | 0–0 |

| 3a. Точность карточек учета запасов: Процент организаций со 100 % | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| № | Продукт | Дозировка продукта | Здравпункты | Медицинские центры | Районные больницы | Региональная больница | Региональные медицинские магазины | Центральные медицинские магазины |
| | Число наблюдений: | | 90 | 90 | 45 | 8 | 8 | 1 |
| 1 | Эфавиренз/Ламивудин/Тенофовир | 600/300/300 мг | -- | 65 % | 84 % | 75 % | 100 % | 100 % |
| 2 | Ламивудин/Зидовудин | 30/60 мг | -- | 70 % | 70 % | 87 % | 87 % | 100 % |
| 3 | Набор для экспресс-диагностики ВИЧ | Нет | 84 % | 75 % | 65 % | 67 % | 50 % | 100 % |
| 4 | Артемизинин/Люмефантрин (АЛ) 6x4 | 20/120 мг | 65 % | 62 % | 71 % | 75 % | 63 % | 0 % |
| 5 | Быстрый диагностический тест на малярию | Нет | 60 % | 63 % | 80 % | 75 % | 63 % | 100 % |
| 6 | Медроксипрогестерона ацетат для инъекций | 104 мг/мл | 75 % | 79 % | 80 % | 87 % | 100 % | 100 % |
| 7 | Левоноргестрел 1–стержневой имплантат | 1–стержневой | 85 % | 81 % | 74 % | 87 % | 100 % | 100 % |
| 8 | Окситоцин для инъекций | 10 МЕ/мл | 45 % | 55 % | 65 % | 75 % | 50 % | 100 % |
| 9 | Сульфат магния для инъекций (50 %) | 5 г/10 мл | 60 % | 45 % | 51 % | 63 % | 50 % | 0 % |
| 10 | Амоксициллин | 250 мг | 47 % | 44 % | 53 % | 63 % | 37 % | 100 % |
| 11 | Парацетамол | 500 мг | 48 % | 50 % | 56 % | 50 % | 50 % | 0 % |
| Диапазон продуктов-маркеров | | | 45–85 % | 44–81 % | 51–84 % | 67–87 % | 50–100 % | 0 % |

| 3b. Среднее отклонение от 100 % точности по организациям (нет отклонения = 0) | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| № | Продукт | Дозировка продукта | Здравпункты | Медицинские центры | Районные больницы | Региональная больница | Региональные медицинские магазины | Центральные медицинские магазины |
| | Число наблюдений: | | 90 | 90 | 45 | 8 | 8 | 1 |
| 1 | Эфавиренз/Ламивудин/Тенофовир | 600/300/300 мг | -- | 156 % | 101 % | 53 % | 13 % | 0 % |
| 2 | Ламивудин/Зидовудин | 30/60 мг | -- | 264 % | 143 % | 189 % | 78 % | 0 % |
| 3 | Набор для экспресс-диагностики ВИЧ | Нет | 60 % | 124 % | 90 % | 76 % | 67 % | 0 % |
| 4 | Артемизинин/Люмефантрин (АЛ) 6x4 | 20/120 мг | 945 % | 846 % | 445 % | 253 % | 90 % | 0 % |
| 5 | Быстрый диагностический тест на малярию | Нет | 80 % | 1406 % | 564 % | 156 % | 38 % | 0 % |
| 6 | Медроксипрогестерона ацетат для инъекций | 104 мг/мл | 225 % | 165 % | 4 % | 85 % | 65 % | 0 % |
| 7 | Левоноргестрел 1–стержневой имплантат | 1–стержневой | 94 % | 85 % | 65 % | 80 % | 89 % | 0 % |
| 8 | Окситоцин для инъекций | 10 МЕ/мл | 6700 % | 4664 % | 897 % | 788 % | 475 % | 45 % |
| 9 | Сульфат магния для инъекций (50 %) | 5 г/10 мл | 554 % | 454 % | 342 % | 225 % | 152 % | 14 % |
| 10 | Амоксициллин | 250 мг | 958 % | 785 % | 667 % | 414 % | 23 % | 85 % |
| 11 | Парацетамол | 500 мг | 1200 % | 945 % | 678 % | 445 % | 245 % | 65 % |
| Диапазон продуктов-маркеров | | | 25–6700 % | 85–4664 % | 4–897 % | 53–788 % | 13–475 % | 0–85 % |

| 4a. Актуальные карточки учета запасов: Процент организаций с актуальными карточками учета запасов (по отчету) | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| № | Продукт | Дозировка продукта | Здравпункты | Медицинские центры | Районные больницы | Региональная больница | Региональные медицинские магазины | Центральные медицинские магазины |
| | Число наблюдений: | | 90 | 90 | 45 | 8 | 8 | 1 |
| 1 | Эфавиренз/Ламивудин/Тенофовир | 600/300/300 мг | -- | 55 % | 90 % | 87 % | 100 % | 100 % |
| 2 | Ламивудин/Зидовудин | 30/60 мг | -- | 49 % | 86 % | 75 % | 100 % | 100 % |
| 3 | Набор для экспресс-диагностики ВИЧ | Нет | 45 % | 61 % | 72 % | 75 % | 75 % | 100 % |
| 4 | Артемизинин/Люмефантрин (АЛ) 6x4 | 20/120 мг | 15 % | 38 % | 55 % | 75 % | 67 % | 100 % |
| 5 | Быстрый диагностический тест на малярию | Нет | 26 % | 44 % | 61 % | 67 % | 75 % | 100 % |
| 6 | Медроксипрогестерона ацетат для инъекций | 104 мг/мл | 40 % | 55 % | 60 % | 87 % | 100 % | 100 % |
| 7 | Левоноргестрел 1–стержневой имплантат | 1–стержневой | 55 % | 62 % | 87 % | 75 % | 100 % | 100 % |
| 8 | Окситоцин для инъекций | 10 МЕ/мл | 10 % | 50 % | 72 % | 50 % | 13 % | 100 % |
| 9 | Сульфат магния для инъекций (50 %) | 5 г/10 мл | 5 % | 29 % | 34 % | 50 % | 25 % | 100 % |
| 10 | Амоксициллин | 250 мг | 17 % | 31 % | 46 % | 50 % | 37 % | 0 % |
| 11 | Парацетамол | 500 мг | 6 % | 25 % | 50 % | 38 % | 50 % | 100 % |
| Диапазон продуктов-маркеров | | | 5–55 % | 25–61 % | 34–90 % | 38–87 % | 13–100 % | 0–100 % |

| 4b. Точность электронных записей в информационной системе управления логистикой: Процент организаций со 100 % (точностью) | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| № | Продукт | Дозировка продукта | Здравпункты | Медицинские центры | Районные больницы | Региональная больница | Региональные медицинские магазины | Центральные медицинские магазины |
| | Число наблюдений: | | 90 | 90 | 45 | 8 | 8 | 1 |
| 1 | Эфавиренз/Ламивудин/Тенофовир | 600/300/300 мг | -- | -- | 44 % | 50 % | 50 % | 100 % |
| 2 | Ламивудин/Зидовудин | 30/60 мг | -- | -- | 30 % | 37 % | 33 % | 100 % |
| 3 | Набор для экспресс-диагностики ВИЧ | Нет | -- | -- | 65 % | 55 % | 50 % | 100 % |
| 4 | Артемизинин/Люмефантрин (АЛ) 6x4 | 20/120 мг | -- | -- | 41 % | 7 % | 63 % | 0 % |
| 5 | Быстрый диагностический тест на малярию | Нет | -- | -- | 50 % | 7 % | 63 % | 100 % |
| 6 | Медروгестерона ацетат для инъекций | 104 мг/мл | -- | -- | 40 % | 37 % | 25 % | 100 % |
| 7 | Левоноргестрел 1–стержневой имплантат | 1–стержневой | -- | -- | 34 % | 37 % | 50 % | 100 % |
| 8 | Окситоцин для инъекций | 10 МЕ/мл | -- | -- | 25 % | 75 % | 50 % | 100 % |
| 9 | Сульфат магния для инъекций (50 %) | 5 г/10 мл | -- | -- | 41 % | 50 % | 50 % | 0 % |
| 10 | Амоксициллин | 250 мг | -- | -- | 33 % | 50 % | 37 % | 100 % |
| 11 | Парацетамол | 500 мг | -- | -- | 36 % | 25 % | 50 % | 0 % |
| Диапазон продуктов-маркеров | | | 0 % | 0 % | 33–65 % | 7–50 % | 25–63 % | 0–100 % |

| 4с. Точность электронных записей в информационной системе управления логистикой: Среднее отклонение от 100 % точности по организациям (нет отклонения = 0) | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| № | Продукт | Дозировка продукта | Здравпункты | Медицинские центры | Районные больницы | Региональная больница | Региональные медицинские магазины | Центральные медицинские магазины |
| | Число наблюдений: | | 90 | 90 | 45 | 8 | 8 | 1 |
| 1 | Эфавиренз/Ламивудин/Тенофовир | 600/300/300 мг | -- | -- | 85 % | 176 % | 87 % | 0 % |
| 2 | Ламивудин/Зидовудин | 30/60 мг | -- | -- | 154 % | 95 % | 64 % | 0 % |
| 3 | Набор для экспресс-диагностики ВИЧ | Нет | -- | -- | 73 % | 111 % | 74 % | 5 % |
| 4 | Артемизинин/Люмефантрин (АЛ) 6x4 | 20/120 мг | -- | -- | 645 % | 175 % | 101 % | 12 % |
| 5 | Быстрый диагностический тест на малярию | Нет | -- | -- | 243 % | 147 % | 98 % | 18 % |
| 6 | Медрогестерона ацетат для инъекций | 104 мг/мл | -- | -- | 846 % | 190 % | 43 % | 3 % |
| 7 | Левоноргестрел 1–стержневой имплантат | 1–стержневой | -- | -- | 1406 % | 158 % | 37 % | 4 % |
| 8 | Окситоцин для инъекций | 10 МЕ/мл | -- | -- | 1635 % | 895 % | 622 % | 78 % |
| 9 | Сульфат магния для инъекций (50 %) | 5 г/10 мл | -- | -- | 15 743 % | 2341 % | 145 % | 67 % |
| 10 | Амоксициллин | 250 мг | -- | -- | 2345 % | 984 % | 452 % | 84 % |
| 11 | Парацетамол | 500 мг | -- | -- | 2505 % | 994 % | 764 % | 153 % |
| Диапазон продуктов-маркеров | | | 0 % | 0 % | 85–15 743 % | 111–2341 % | 37–764 % | 0–78 % |

4d. Актуальные записи в электронной информационной системе управления логистикой: Процент организаций с актуальными записями в электронной информационной системе управления логистикой

| № | Продукт | Дозировка продукта | Здравпункты | Медицинские центры | Районные больницы | Региональная больница | Региональные медицинские магазины | Центральные медицинские магазины |
|-----------------------------|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | Число наблюдений: | | 90 | 90 | 45 | 8 | 8 | 1 |
| 1 | Эфавиренз/Ламивудин/Тенофовир | 600/300/300 мг | -- | -- | 10 % | 87 % | 100 % | 100 % |
| 2 | Ламивудин/Зидовудин | 30/60 мг | -- | -- | 16 % | 75 % | 100 % | 100 % |
| 3 | Набор для экспресс-диагностики ВИЧ | Нет | -- | -- | 22 % | 75 % | 75 % | 100 % |
| 4 | Артемизинин/Люмефантрин (АЛ) 6x4 | 20/120 мг | -- | -- | 25 % | 67 % | 75 % | 100 % |
| 5 | Быстрый диагностический тест на малярию | Нет | -- | -- | 31 % | 67 % | 7 % | 100 % |
| 6 | Медоксипрогестерона ацетат для инъекций | 104 мг/мл | -- | -- | 50 % | 75 % | 100 % | 100 % |
| 7 | Левоноргестрел 1–стержневой имплантат | 1–стержневой | -- | -- | 37 % | 75 % | 100 % | 100 % |
| 8 | Окситоцин для инъекций | 10 МЕ/мл | -- | -- | 22 % | 38 % | 50 % | 100 % |
| 9 | Сульфат магния для инъекций (50 %) | 5 г/10 мл | -- | -- | 4 % | 25 % | 38 % | 100 % |
| 10 | Амоксициллин | 250 мг | -- | -- | 16 % | 50 % | 25 % | 0 % |
| 11 | Парацетамол | 500 мг | -- | -- | 10 % | 38 % | 38 % | 100 % |
| Диапазон продуктов-маркеров | | | 0 % | 0 % | 10–50 % | 25–87 % | 7–100 % | 0–100 % |

5. Убытки в результате повреждения, краж и истечения срока годности: Процентное соотношение поврежденных, утраченных или просроченных запасов к общему количеству доступных запасов

| № | Продукт | Дозировка продукта | Здравпункты | Медицинские центры | Районные больницы | Региональная больница | Региональные медицинские магазины | Центральные медицинские магазины |
|-----------------------------|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | Число наблюдений: | | 90 | 90 | 45 | 8 | 8 | 1 |
| 1 | Эфавиренз/Ламивудин/Тенофовир | 600/300/300 мг | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 2 | Ламивудин/Зидовудин | 30/60 мг | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 3 | Набор для экспресс-диагностики ВИЧ | Нет | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 4 | Артемизинин/Люмефантрин (АЛ) 6x4 | 20/120 мг | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 5 | Быстрый диагностический тест на малярию | Нет | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 6 | Медоксипрогестерона ацетат для инъекций | 104 мг/мл | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 7 | Левоноргестрел 1–стержневой имплантат | 1–стержневой | 4 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 8 | Окситоцин для инъекций | 10 МЕ/мл | 6 % | 3 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 9 | Сульфат магния для инъекций (50 %) | 5 г/10 мл | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 10 | Амоксициллин | 250 мг | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 11 | Парацетамол | 500 мг | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Диапазон продуктов-маркеров | | | 0–4 % | 0–1 % | 0–1 % | 0 % | 0 % | 0 % |